总糖含量试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

糖类物质是构成植物体的重要组成成分之一，也是新陈代谢的主要原料和贮存物质。总糖也可称为碳水化合物，包括可溶性的单糖，二糖以及不溶性的淀粉，纤维素，几丁质等。

测定原理：

总糖酸水解为还原糖，在 NaOH 和丙三醇存在下，DNS 试剂与还原糖共热后被还原成氨基化合物，在过量的 NaOH 碱性溶液中呈桔红色，在 540nm 处有最大吸收峰，以此测定样品中的总糖含量。

组成：

产品名称	GMS039-100T/96S	Storage
试剂一：液体	100ml	4℃
试剂二：液体	100ml	4℃
试剂三：液体	5ml	4℃避光
说明书	一份	

自备仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、沸水浴、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、蒸馏水。

样品中总糖的提取：

组织：称取约 0.1g 样品，加入 1ml 试剂一，1.5ml 蒸馏水，匀浆，95℃水浴中加热 30min，加入 1ml 试剂二，混匀，用蒸馏水定容至 10ml，8000g 25℃离心 10min，取上清液待测。（注意稀释，见注意事项）
液体样本：取 0.1ml 样本，加入 1ml 试剂一，1.5ml 蒸馏水，匀浆，95℃水浴中加热 30min，加入 1ml 试剂二，8000g 25℃离心 10min，取上清液待测。（注意稀释，见注意事项）

测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零。
2、调节水浴锅至 95 度。

3、加样表：

试剂（μl）	空白管	测定管

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利

样本		8
蒸馏水	16	8
试剂三	12	12

混匀，置 95 度水浴中 10min（盖紧，以防止水分散失），冷却至室温

蒸馏水	172	172

混匀，540nm 测定吸光值，ΔA=A 测定管-A 空白管

注意：1、空白管只要做一管。

2、如果ΔA 大于 2，需要将上清液用蒸馏水稀释，计算公式中乘以相应稀释倍数。

总糖含量计算：

1、标准条件下测定的回归方程为 y = 0.3002x - 0.0507；x 为标准品浓度（mg/ml），y 为吸光值。

2、按样本鲜重计算：

总糖（mg /g 鲜重）= [(ΔA + 0.0507) ÷0.3002×V1]÷（W×V1÷V2）×稀释倍数=33.311×(ΔA + 0.0507) ÷W×稀释倍数。

3、按样本蛋白浓度计算：

总糖（mg /mg prot）=[(ΔA + 0.0507) ÷0.3002×V1]÷(V1×Cpr) ×稀释倍数=3.3311×(ΔA + 0.0507) ÷Cpr×稀释倍数。

V1：加入样本体积，0.008ml；V2：加入提取液体积，10ml； Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml；W：样本鲜重，g。

4、按照液体体积计算：

总糖（mg /ml）=[(ΔA + 0.0507) ÷0.3002×V1]÷（V3×V1÷V2）×稀释倍数=116.59×(ΔA + 0.0507)×稀释倍数。

V1：加入样本体积，0.008ml；V2：加入提取液体积，10ml/3.5ml； V3:液体样本，0.1ml；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml；W：样本鲜重，g。

注意：最低检测限为 1mg/g 鲜重或 10ng/mg prot

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利